



Д-р Петьо Компански, дм, началник на Отделението по гастроентерология: Фиброгастроскопията е ключова в борбата с рака на стомаха

Сряда, 30 Август 2017

В последните години фиброгастроскопията е най-използваният метод в диагностиката на злокачествените заболявания на храносмилателния тракт – предимно на хранопровода и стомаха. Това споделя д-р Петьо Компански, дм, началник на Отделението по гастроентерология на УМБАЛ Бургас. Тази година д-р Компански отбелязва 31 години откакто работи в лечебното заведение, като за това време той е натрупал не само безценен опит, но и впечатления от какви заболявания на стомаха най-често страдат бургазлии. Сред засегнатите са както хора на средна възраст, така и съвсем млади.

Отделението, което завежда д-р Компански, разполага с последен клас ендоскопска апаратура с видеонаблюдение - фиброгастроскоп и фиброколоноскоп.

„Фиброгастроскопията е най-съвременният метод, който допринесе много за намаляване на риска от развитие на рак на стомаха. Чрез нея могат да бъдат засечени най-ранните стадии при карцином на стомаха и карцином *in situ* – промените, които настъпват в лигавичния релеф. Те се диагностицират ендоскопски и хистологично, на базата на вземане на хистологичен материал с биопсична щипка от лигавицата на стомаха“, обяснява специалистът.

При фиброгастроскопията се прониква през устната кухина с тънка оптична тръба, която преминава през хранопровода и достига до стомаха и началото на дванадесетопръстника. Чрез нея се оглеждат детайлно измененията на тъканите и лигавиците.

„Ендоскопията и фиброгастроскопията помагат и за ранната диагноза на язвата на стомаха. Тя на всяка цена трябва да се диагностицира ендоскопски и хистологично, защото представлява преканцероза (предраково състояние). Изследването е показано и при функционална диспепсия на стомаха, при която често при взети стомашни биопсии се открива наличието на бактерията хеликобактер пилори“, разяснява д-р Компански.

Лечението при хеликобактер пилори не трябва да се пренебрегва, защото бактерията води до развитие на хиперацидни гастрити, язва на дуоденума (дванадесетопръстника), язва на стомаха, полипозна дисплазия (полипи) и най-вече развитие на онкологично заболяване. Хеликобактер пилори се отстранява чрез медикаментозно лечение и хигиенно-диетичен режим.

„ Най-често от язва на стомаха страдат хора на възраст между 45 и 55 години. Това се дължи както на възрастовите промени, така и на стрес, тютюнопушене, работа с токсични препарати, заразяване с хеликобактер пилори, а в Бургас роля играят и морските влияния“, обяснява д-р Компански. Гастроскопии обаче често се налагат и при млади хора на възраст 18-20 години.

Пациентите, които имат въпроси за изследването, могат да се свържат с Отделението по гастроентерология на УМБАЛ Бургас на тел: 08887 36103 в делнични дни.